

M2REG-AOD-2324-ASM-SET 2-MATH

建議題解

1. $f'(x) = 2 \cos x - 1$ 1A

當 $f'(x) = 0$,

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3}$$

1A

x	$0 < x < \frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3} < x < \pi$
$f'(x)$	+	-

1M

$f(0) = 0$; $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$ 及 $f(\pi) = -\pi$ 。

$f(x)$ 的最大值為 $\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$ 。

1A

$f(x)$ 的最小值為 $-\pi$ 。

1A

2. (a) $\frac{dy}{dx} = 3 \sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 1M

當 $\frac{dy}{dx} = 0$, $x = \frac{\pi}{6}$ 。

駐點為 $\left(\frac{\pi}{6}, 1 + \pi\right)$ 。

1A

(b)

x	$0 < x < \frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$
$\frac{dy}{dx}$	+	-

1M

$\left(\frac{\pi}{6}, 1 + \pi\right)$ 為極大點。

1A

3. (a) $\frac{dy}{dx} = e^{x+1} + xe^{x+1}$ 1A

$$= e^{x+1}(1 + x)$$

當 $\frac{dy}{dx} = 0$, $x = -1$ 。

駐點為 $(-1, -1)$ 。

1A

(b)

x	$x < -1$	$x > -1$
$\frac{dy}{dx}$	-	+

1M

$(-1, -1)$ 為極小點。

1A

$$4. \quad \frac{dy}{dx} = 2x(1-3x^2)^{\frac{1}{2}} + x^2 \left(\frac{1}{2}\right) (1-3x^2)^{-\frac{1}{2}} (-6x) \quad 1M$$

$$= (1-3x^2)^{-\frac{1}{2}} [2x(1-3x^2) - 3x^3]$$

$$= (1-3x^2)^{-\frac{1}{2}} (-9x^3 + 2x)$$

$$\text{當 } \frac{dy}{dx} = 0, x = 0 \text{ 或 } \pm \frac{\sqrt{2}}{3}。$$

x	$-\frac{\sqrt{3}}{3} < x < -\frac{\sqrt{2}}{3}$	$-\frac{\sqrt{2}}{3} < x < 0$	$0 < x < \frac{\sqrt{2}}{3}$	$\frac{\sqrt{2}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{dy}{dx}$	+	-	+	-

1M

$$\text{極大點為 } \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{27}\right) \text{ 及 } \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{27}\right)。$$

1A

$$\text{極小點為 } (0, 0)。$$

1A

$$5. \quad (a) \quad \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(x+h)^2}{(x+h)+1} - \frac{x^2}{x+1}}{h} \quad 1M$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2(x+1) - x^2(x+h+1)}{h(x+1)(x+h+1)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hx^2 + (h^2 + 2h)x + h^2}{h(x+1)(x+h+1)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + (h+2)x + h}{(x+1)(x+h+1)}$$

1M

$$= \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

1A

$$(b) \quad \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} \geq 0$$

1M

$$x(x+2) \geq 0$$

$$x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 0$$

1A

$$(\text{接受 } x < -2 \text{ 或 } x > 0)$$

$$6. \quad (a) \quad \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{6}{(x+h)^2} + \frac{6}{x^2}}{h} \quad 1M$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6(x+h)^2 - 6x^2}{hx^2(x+h)^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12x + 6h}{x^2(x+h)^2}$$

1M

$$= \frac{12x}{x^4}$$

$$= \frac{12}{x^3}$$

1A

$$(b) \quad \text{當曲線為遞增時, } \frac{dy}{dx} = \frac{12}{x^3} \geq 0。$$

1M

$$\text{所求範圍為 } x > 0。$$

1A

7. (a) $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4kx - 4k^2$ 1M
 $= (x - 2k)(3x + 2k)$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6x - 4k$$

當 $\frac{dy}{dx} = 0$, $x = 2k$ 或 $-\frac{2k}{3}$ 。

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=2k} = 6(2k) - 4k = 8k > 0$$

1M

因此， y 在 $x = 2k$ 時達至局部極小值。

1

(b) $(2k)^3 - 2k(2k)^2 - 4k^2(2k) = -1000$

$$-8k^3 = -1000$$

$$k^3 = 125$$

$$k = 5$$

1A

8. (a) $f'(x) = 12x^2 + 4kx + 15$ 1A

(b) 由於 $f(x)$ 為連續且沒有轉向點，可得對所有 $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) \geq 0$ 或 $f'(x) \leq 0$ 。

$$\Delta = (4k)^2 - 4(12)(15) \leq 0$$

1M

$$16k^2 - 720 \leq 0$$

$$-3\sqrt{5} \leq k \leq 3\sqrt{5}$$

1A

9. (a) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x(x+1) - (x^2+p)}{(x+1)^2}$ 1M

$$= \frac{x^2 + 2x - p}{(x+1)^2}$$

1A

(b) (i) $\frac{1^2 + 2 - p}{(1+1)^2} = 0$

1M

$$p = 3$$

1A

(ii) $x^2 + 2x - 3 = 0$

1M

$$x = -3 \text{ 或 } 1$$

x	$x < -3$	$-3 < x < -1$	$-1 < x < 1$	$x > 1$
$\frac{dy}{dx}$	+	-	-	+

1M

當 $x = -3$, $y = -6$; 當 $x = 1$, $y = 2$ 。

局部極大值為 -6 , 局部極小值為 2 。

1A+1A

10. (a) $y = 1 + \frac{\ln x}{x}$
- $$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{x}(x) - \ln x(1)}{x^2} \quad 1M$$
- $$= \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad 1A$$
- $$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x^2\left(-\frac{1}{x}\right) - (1 - \ln x)(2x)}{x^4}$$
- $$= \frac{-3x + 2x \ln x}{x^4}$$
- $$= \frac{2 \ln x - 3}{x^3} \quad 1A$$
- (b) 當 $\frac{dy}{dx} = 0$,
- $$1 - \ln x = 0$$
- $$\ln x = 1$$
- $$x = e$$
- 當 $x = e$, $y = \frac{e + \ln e}{e} = \frac{e + 1}{e}$ 。
- 駐點為 $\left(e, \frac{e + 1}{e}\right)$ 。 1A
- $$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=e} = \frac{2 \ln e - 3}{e^3} = -\frac{1}{e^3} < 0 \quad 1M$$
- $\left(e, \frac{e + 1}{e}\right)$ 為極大點。 1A
-
11. (a) $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x} - (x + 1)(2e^{2x})}{e^{4x}} \quad 1M$
- $$= \frac{-2x - 1}{e^{2x}} \quad 1A$$
- $$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2e^{2x} - (-2x - 1)(2e^{2x})}{e^{4x}}$$
- $$= \frac{4x}{e^{2x}} \quad 1A$$
- (b) $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - 1}{e^{2x}} = 0 \quad 1M$
- $$x = -\frac{1}{2}$$
- 駐點為 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{e}{2}\right)$ 。 1A
- $$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{\left(-\frac{1}{2}, \frac{e}{2}\right)} = \frac{4\left(-\frac{1}{2}\right)}{e^{-1}}$$
- $$= -2e$$
- $$< 0$$
- 這是極大點。 1A

12. (a) $f'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}$ 1A
 當 $f'(x) = 0$,

$$\ln x = 1$$

$$x = e$$
1M

x	$0 < x < e$	$x > e$
$f'(x)$	+	-

1M

$f(x)$ 的極大值為 $f(e) = \frac{1}{e}$ 。 1A

(b) 利用 (a) , $f(x) \leq f(e)$ 。

$$\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$$
1M

$$\ln x^e \leq x$$

$$e^x \geq x^e$$
1